

En compliment dels protocols de mesures de prevenció contra la COVID-19 elaborats per La Salle Catalunya i seguint les instruccions del Departament de Salut i d'Ensenyament per a un retorn segur a les aules, es fa entrega del Check-list que han de seguir les famílies per validar que el seu fill o filla no presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni és un possible contacte estret.

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d'aquests símptomes presenta:

<input type="checkbox"/>	Febre o febrícula (es considera a partir de 37,5°C)	<input type="checkbox"/>	Vòmits
<input type="checkbox"/>	Tos	<input type="checkbox"/>	Diarrea
<input type="checkbox"/>	Dificultat per respirar	<input type="checkbox"/>	Malestar general, cansament
<input type="checkbox"/>	Congestió nasal*	<input type="checkbox"/>	Dolor muscular
<input type="checkbox"/>	Mal de coll*	<input type="checkbox"/>	Pèrdua de l'olfacte i/o gust
<input type="checkbox"/>	Mal de panxa	<input type="checkbox"/>	

(*) La Congestió nasal i el mal de coll es consideraran quan van acompanyats d'altres símptomes com la febre.

NOTA: la variant Delta dels SARS-CoV-2 s'associa a símptomes clínics menys descrits, semblants al refredat comú: rinorrea, congestió nasal, esternuts, mal de gola i cefalees.

Si a casa hi ha alguna persona adulta (i es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.) que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d'aquests símptomes presenta:

<input type="checkbox"/>	Febre o febrícula (es considera a partir de 37,5°C)	<input type="checkbox"/>	Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
<input type="checkbox"/>	Tos	<input type="checkbox"/>	Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
<input type="checkbox"/>	Dificultat per respirar	<input type="checkbox"/>	Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)
<input type="checkbox"/>	Mal de coll*-	<input type="checkbox"/>	Refredat nasal*-

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s'han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

RECORDEU:

Si heu marcat una o diverses caselles **cal que eviteu portar l'infant** a l'activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de l'activitat per comunicar-ho.

En horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre **equip de pediatria** o de **capçalera**. En cas contrari, truqueu al **061**.

NO cal entregar aquest Check-list a l'escola. Només cal notificar el seu resultat de forma directa o a través del seu fill, filla o infant o adolescent tutelat.